



I5 - implant stożkowy, o agresywnym gwincie, dedykowany do kości D3 i D4, może być jednak stosowany w każdym typie kości. Dzięki specyficznemu kształtowi ma właściwości kondensujące. Uzyskując doskonałą stabilizację pierwotną, zwiększa szansę na dobrą stabilizację wtórną.



I5-3 - implant wąski, jedno i dwufazowy - średnica od 2.4 mm! Niezastąpiony przy wąskim wyrostku i wąskich przestrzeniach między zębami lub implantami. Wykorzystywany często przy braku zawiązków lub do stabilizacji protez przy wyrostkach zanikłych, żyłkowych.



P5-3.75,3



P25-3.75,5



P55

Lokator (P25) i Low-connector (P55) - popularne i lubiane rozwiązania do stabilizacji protez o różnych wysokościach (1, 2, 3, 4, 5, i 6 mm).



marrodent®


AB™

wyłączny dystrybutor
AB Dental Devices Ltd w Polsce

www.ab-dent.com
www.marrodent.pl



O więcej informacji zapytaj
swojego lekarza implantologa.



Uśmiech
jest Twoim atutem

AB™

marrodent®

Co to jest implant?



Implanty stomatologiczne to śrubki tytanowe, o specjalnie preparowanej powierzchni, które mają zdolność pełnego zrastania się z kością. Na wgojonym implancie wykonuje się uzupełnienie protetyczne, które przywraca pacjentowi komfort żucia i naturalny wygląd uzębienia.



Kiedy implant jest korzystny dla pacjenta?

Brak pojedynczego zęba

W przypadku braku pojedynczego zęba implant stanowi rozwiązanie idealne pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Pozwala uniknąć szlifowania zębów sąsiednich, a korona na implancie do złudzenia przypomina naturalny ząb.



Brak kilku zębów




W przypadku braku kilku zębów obok siebie zastosowanie zwykłych protez ruchomych opartych na dziąsłach może powodować dyskomfort, ból i znaczne obniżenie efektywności żucia. Most na implantach pozwala uniknąć tych niedogodności.



Bezzębie

W tym przypadku możliwe są dwa rozwiązania:

- Kilka implantów jako podstawa po odbudowę stałą
- Kilka implantów stabilizujących protezę z wykorzystaniem specjalnych zatrzasków, zapewniających bezpieczeństwo i pewność siebie podczas żucia i mówienia.



Często zadawane pytania



Czy wszczęcie implantów boli?

Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, jak zwykłe leczenie zębów i jest bezbolesny

Jak trwałe są wszczęzione implanty?

Implanty wgojone i prawidłowo oprotezowane, przy zachowaniu zaleceń dotyczących higieny i profilaktyki, będą służyły przez wiele lat.

Czy po zabiegu czuje się ból lub inne dolegliwości?

Jest to sprawa indywidualna, zależy od pacjenta. Czasami występuje lekki ból, jak po ekstrakcji zęba, który można łatwo usmierzyć środkami przeciwbólowymi. Może wystąpić lekki obrzęk, ustępujący po kilku dniach.

Czy będę w stanie żuć jak własnymi zębami?

Odczucie i efektywność żucia są podobne, jak przy zębach naturalnych.

O więcej informacji zapytaj swojego lekarza implantologa lub zadzwoń do naszego konsultanta.