

# JAKOŚĆ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ, CENA, KTÓREJ OCZEKUJESZ



## Orabloc®

Roztwór do wstrzykiwań (chlorowoderek artykainy 4%  
oraz adrenalina 1:100 000 lub 1:200 000)

Wyłączny dystrybutor w Polsce

**marrodent®**  
A HENRY SCHEIN® COMPANY

## Roztwór do wstrzykiwań zawierający chlo- rowodorek artykainy 4% oraz adrenalinę (epi- nefrynę) w stężeniu 1:100 000 lub 1:200 000.

- » Szybki początek działania znieczulającego - w ciągu 1-3 minut od podania.
- » Pełne znieczulenie trwa około 1 godziny w przypadku infiltracji, do 2 godzin w przypadku blokady nerwów.
- » Jedynie 10% nadmiaru epinefryny<sup>1</sup>.
- » Okres trwałości 24 miesiące w temperaturze pokojowej.
- » Nie zawiera wersenianu sodowego, metyloparabenu i lateksu.
- » Najczęściej występujące działania niepożądane (częstość występowania >2%) to ból głowy.
- » Każdy wkład indywidualnie zamknięty w blistrze w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

### Lek Orabloc jest wskazany do znieczulenia miejscowego, nasiękowego lub przewodowego zarówno w prostych, jak i złożonych zabiegach stomatologicznych:

- » W większości rutynowych zabiegów stomatologicznych preferowany jest lek Orabloc zawierający epinefrynę w stężeniu 1:200 000.
- » Kiedy wymagana jest bardziej wyraźna homeostaza lub lepsza wizualizacja pola operacyjnego, można użyć leku Orabloc zawierającego epinefrynę w stężeniu 1:100 000.

### Oba składy leku Orabloc mają 24-miesięczny okres trwałości.

- » Przechowywać w temperaturze pokojowej 25°C (77°F), z dopuszczalnymi krótkimi okresami pomiędzy 15°C (59°F) a 30°C (86°F).
- » Chronić przed światłem.
- » Nie mrozić.

### Opakowanie leku Orabloc

- » Każdy wkład jest indywidualnie zamknięty w blistrze w celu zapewnienia maksymalnej ochrony aż do momentu użycia.
- » Wkłady są zapakowane po 10 sztuk w blistrze,
- » Blistry pakowane są w pudełka po 50 sztuk.

### Dawkowanie i sposób podawania:

#### Osoby dorosłe

- » W przypadku zdrowych osób dorosłych, maksymalna dawka leku Orabloc podawana metodą nasiękową podśluzówkową i/lub metodą blokady nerwów nie powinna przekraczać 7mg/kg masy ciała artykainy HCl.
- » Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobami serca lub wątroby.

#### Dzieci w wieku od 4 do 16 lat

- » Ilość wstrzykiwanego leku Orabloc u dzieci w wieku od 4 do 16 lat powinna być określona na podstawie wieku i wagi dziecka oraz zakresu zabiegu stomatologicznego.
- » Maksymalna dawka leku Orabloc nie powinna przekraczać 5 mg/ kg masy ciała artykainy HCl (patrz: Dawkowanie u dzieci i młodzieży). Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 roku życia.



### WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważać, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia wewnątrznaczyniowego, które może wiązać się z drgawkami, a następnie śpiączką i zatrzymaniem oddechu. Roztwory znieczulenia miejscowego, które zawierają substancję obkurczającą naczynia krwionośne, powinny być stosowane ostrożnie, szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością układu krążenia lub chorobą naczyń krwionośnych. Podanie leku Orabloc powoduje 3-krotny do 5-krotnego wzrost stężenia epinefryny w osoczu w porównaniu z poziomem wyjściowym. Jednak u zdrowych dorosłych nie wydaje się, aby podawanie leku wiązało się z wyraźnym wzrostem ciśnienia krwi lub rytmu akcji serca, z wyjątkiem przypadkowego wstrzyknięcia wewnątrznaczyniowego. Najczęściej występujące działania niepożądane (częstość występowania >2%) to ból głowy. Należy informować pacjentów z wyprzedzeniem o możliwości czasowej utraty czucia i funkcji mięśni po wstrzyknięciach nasiękowych i blokadach nerwów. Należy poinstruować pacjentów, aby nie jedli i nie pili aż do czasu powrotu normalnego czucia.

Należy zapoznać się z załączoną pełną charakterystyką leku lub odwiedzić stronę internetową [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

Lek Orabloc jest amidowym środkiem znieczulającym miejscowo, zawierającym substancję obkurczającą naczynia krwionośne, wskazanym do znieczulenia miejscowego, nasiękowego lub przewodowego zarówno w prostych, jak i złożonych zabiegach stomatologicznych. Lek Orabloc zawiera pirosiarczyn sodu. Lek Orabloc jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy są nadwrażliwi na produkty zawierające siarczyny. Produkty zawierające siarczyny mogą wywoływać reakcję typu alergicznego, w tym objawy anafilaktyczne oraz zagrażające życiu lub mniej poważne epizody astmatyczne u niektórych podatnych osób. Aby zapoznać się z załączoną pełną charakterystyką leku lub ją pobrać, należy odwiedzić stronę internetową [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

Należy zapoznać się z załączoną pełną charakterystyką leku lub odwiedzić stronę internetową [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com) używając kodu QR.

Aby dowiedzieć się więcej o leku Orabloc, skontaktuj się telefonicznie z Pierrel, nr tel. 1-610-989-4222 lub wyślij e-mail do [orabloc@pierrelgroup.com](mailto:orabloc@pierrelgroup.com)



<sup>1</sup>Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association lub AHA) zaleca stosowanie możliwie jak najmniejszej ilości epinefryny (Kaplan EL ed. Choroby sercowo-naczyniowe w praktyce stomatologicznej. Dallas, TX: Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne, 1986)

